

**HALLO. IEMAND WAARMEE JE SEKSUEEL CONTACT HEBT GEHAD,
HEEFT EEN SEKSUEEL OVERDRAAGBARE AANDOENING (SOA) OPGELOPEN.
MOGELIJK BEN JIJ OOK BESMET. LAAT JE DAAROM TESTEN.**

Een persoon waarmee jij seksueel contact hebt gehad, heeft bij een arts een test op soa's (seksueel overdraagbare aandoeningen) laten uitvoeren. Er werd(en) volgende infectie(s) vastgesteld:

<input type="checkbox"/> Chlamydia	<input type="checkbox"/> Hepatitis B	<input type="checkbox"/> Genitale wratten (HPV)
<input type="checkbox"/> Gonorrhoe	<input type="checkbox"/> Hepatitis C	<input type="checkbox"/> Genitale herpes
<input type="checkbox"/> Syfilis	<input type="checkbox"/> HIV	<input type="checkbox"/> Trichomonas

Deze persoon wenst anoniem te blijven maar wil jou toch verwittigen via deze brief. Zo kan jij je ook laten testen en laten behandelen als dat nodig zou zijn. Ga daarom naar je **huisarts** en neem deze brief mee.

Ook wanneer je zelf **geen klachten** hebt, laat je je best testen. Veel soa's geven niet direct klachten, maar kunnen ondertussen wel ernstige schade aanrichten. Zo kan b.v. een chlamydia-infectie die geen klachten geeft, toch leiden tot vruchtbaarheidsproblemen.

Maar geen paniek! Meestal kunnen soa's zoals chlamydia en gonorrhoe **snel en eenvoudig behandeld** worden met antibiotica en is het probleem volledig opgelost.

Ben je besmet met het hepatitis B-, het hepatitis C- of het hiv-virus, dan zal je arts zorgen voor een afspraak bij een gespecialiseerde arts of centrum zodat je zo snel mogelijk de beste behandeling krijgt.

Wil je meer weten: www.seksualiteit.be

Wil jouw arts meer weten: www.domusmedica.be/documentatie/dossiers

Deze informatie wordt u met de beste bedoelingen bezorgd door:

Stempel arts:

Gelieve niet te informeren naar de identiteit van de persoon die u wenst te verwittigen.

De arts zal het medisch geheim van zowel deze persoon als van u eerbiedigen.

Meer informatie voor de arts:

Doe bij elke persoon die zich met deze brief aanbiedt een PCR-test voor Chlamydia en gonorrhoe. De analyse voor zowel Chlamydia als gonorrhoe, gebeurt op hetzelfde staal.

	voorkeur	ook nog goed	minst ideaal	niet
mannen	eerstestraalsurine (2u ervóór niet geplast)	urethrale PCR-wisser (pijnlijk)	/	serologie
vrouwen	PCR-wisser cervicaal afgenomen (meest sensitief)	PCR-wisser vaginaal afgenomen (voordeel: geen speculum, patiënte kan dit zelf)	eerstestraalsurine (2u ervóór niet geplast)	serologie

Gaat het om een orale of anale besmetting: neem dan m.b.v. een PCR-wisser een staal van de keel of de anus (zie dossier "SOI in de huisartsenpraktijk" op www.domusmedica.be).

Voer eventueel ook een test op syfilis uit (bloedname) indien dit nooit eerder gebeurde of het al lang geleden is dat het gebeurde (b.v. > 3 jaar geleden).

Vraag vervolgens verder door om te bepalen of de patiënt ook getest moet worden op HBV, syfilis en HIV. Dit doe je via een bloedname: HBV door bepaling van HBsAg, syfilis via TPHA/CLIA en HIV via opsporing van specifieke antistoffen.

Patiënten die zeker een bloedanalyse op HBV, syfilis en HIV en eventueel ook op HCV aangeboden dienen te krijgen zijn:

- mensen met risicovol seksueel gedrag: zeer frequent wisselende partners (≥2 partners voorbij 6 maanden) of zeer "ruwe" seks (risico op scheuren van slijmvlies: anale seks, "fisting", diepe orale seks)
- mannen die seks hebben met mannen (MSM)
- personen afkomstig uit HIV/ HBV/ HCV- endemische gebieden die zich nooit eerder lieten testen of personen wiens partner afkomstig is uit een HIV/ HBV/ HCV- endemisch gebied en deze zich nog nooit liet testen. Voor HIV gaat het vooral om subsaharaans Afrika.
- IVdruggebruikers
- zwangeren

Behandeling	
Chlamydia	Azitromycine 1g PO single dose
gonorrhoe	Ceftriaxone IM injectie + Azitromycine 2g PO single dose
syfilis	Benzathine benzylpenicilline 2,4 milj IE IM injectie; afhankelijk van het stadium te herhalen
HBV	Verwijzen naar een gespecialiseerd centrum/ hepatoloog
HIV	Verwijzen naar een aidsreferentiecentrum (ARC)