

Psoriasis Vulgaris

A. Bervoets

Universiteit Antwerpen



Psoriasis Vulgaris

1. Diagnose en differentiaaldiagnose
2. Dovobet®: Nieuwe lokale behandeling
3. Biologicals: Nieuwe behandeling
4. Tips

Diagnose

anamnese

- erfelijke factor
- uitlokkende factoren
- aangetaste lokalisaties
- jeuk

kliniek

- scherp afgeijnd
- schilfering
- symmetrisch
- typische plaatsen
- Koebner fenomeen

Diagnose

4

verschillende
vormen

- psoriasis vulgaris
- psoriasis guttata
- psoriasis inversa
- psoriasis palmoplantaris
- psoriasis pustulosa
- nagelpsoriasis
- erythrodermie
































































Differentiële diagnose (I)

- eczeem – eczematiden
- mycose
- pityriasis rosea van Gibert
- lichen ruber
- onychomycose
- intertrigo

Differentiële diagnose (II)

A.

- handen en voeten
- schedelhuid
- aangezicht

B.

- pityriasis rubra pilaris
- pityriasis lichenoides chronica
- mycosis fungoïdes













18 8'98



















































Dovobet® : Nieuwe lokale behandeling

Tegen de versnelde celdeling

- Normaliseren van celdifferentiatie
- Anti-proliferatief
 - Schilfers
 - Huidverdikking

Tegen de ontsteking

- Ontstekingsremmend
- Immunosuppressief
 - Roodheid



Dovobet® : Nieuwe lokale behandeling



na 4 weken
Dovobet®

1 x
daags



Universiteit Antwerpen




Dovobet® : Nieuwe lokale behandeling



na 4 weken
Dovobet®



Dovobet® : Nieuwe lokale behandeling




Dovobet® : Nieuwe lokale behandeling

Ernstige psoriasis wordt ook behandeld met *fototherapie, systemische behandelingen* en de *nieuwe biologicals*.

Deze behandelingen hebben enkele weken nodig om op kruissnelheid te komen.

Dovobet® kan een “**jump-start**” geven zodat patiënten gemotiveerd blijven om die behandelingen trouw verder te zetten.

Dovobet® : behandeladvies



Gedurende 4 weken (of langer indien nodig),
Dovobet® 1 x daags aanbrengen. Wanneer
de psoriasis voldoende afgenomen is, de
behandeling met Dovobet® beëindigen.
Herhalen bij elke volgende opflakking.

Biologicals

Cept fusion protein

Umab human monoclonal Ab

Zumab humanised monoclonal Ab

Ximab chimeric monoclonal Ab

etanercept (Enbrel®)

alefacept (Amevive®)

adalimumab (Humira®)

efalizumab (Raptiva®)

Infliximab (Remicade®)

Biologicals

- nieuwe klasse
- voor ernstige psoriasis
- terugbetalingscriteria :
 - PUVA
MTx (15 mg - 3 maanden)
CyA (2,5 mg/kg - 2 maanden)
 - PASI of BSA > 10

Biologicals

- Etanercept (ENBREL®)
fusie-eiwit anti-TNF α
S.C. 2 x week 25 mg
- Infliximab (REMICADE®)
IV chimerisch monoklonaal anti TNF- α
- Adalimumab (HUMIRA®)
S.C. humaan monoklonaal anti TNF- α

Neveneffecten (I)

- infecties
 - bovensteluchtweginfecties, bronchitis, cystitis, huidinfecties
 - ernstige infecties: zelden
 - TBC : zelden
- allergische reacties :
 - pruritus, angioedema, urticaria, rash

Neveneffecten (II)

- lokale reacties op de inspuitplaats
bloeding – erytheem – pruritus – pijn
- subacute LE – discoide LE – lupus like syndrome
- congestief hartfalen ↗
- neurologisch : cave MS
- hematologisch
- op lange termijn ?

Tips

- aandacht voor uw patiënt
- medicatie : β -blokkers, antimalariamiddelen, lithium
- praktisch :
 - crème - zalf
 - alcoholische lotions
 - haren
 - smeren : beu !
- arthritis klachten